

Uloga eho tehničara u dijagnostici i perkutanom zatvaranju FOA i ASD-a

ASD je najčešća urođena srčana mana. To je komunikacija između desne i leve pretkomore. Do pre deset godina bilo je nezamislivo nehiruško zatvaranje ASD. Danas se u našoj kući uspešno zatvara ASD perkutano. Mi smo jedina ustanova u Srbiji u kojoj se ASD zatvara okluderom. Postoji više vrsta ASD i samo se ASD sekundum može zatvoriti perkutano. Procena mogućnosti zatvaranja ASD se vrši TEE pregledom. Eho tehničari aktivno učestvuju u proceduri samog pregleda, kako u dijagnostici tako i tokom same procedure na Ro. Pored zatvaranja ASD kod nas se radi i perkutano zatvaranje FOA. FOA je komunikacija između leve i desne pretkomora, to je u intrauterinom razvoju normalno. Po rođenju deteta FOA bi trebalo da se zatvori. U 5 do 7 % slučajeva to se ne dogodi, ali to automatski ne znači patološki nalaz. Nekada kod pacijenata sa FOA dolazi do CVI i TIA i tada je indicirano perkutano zatvaranje FOA. Eho tehničari su nezamenljivi članovi tima koji učestvuju u dijagnostici, zatvaranju i praćenju pacijenata sa ASD i FOA.